

CÂY MẮT MÈO

Là một loại dây leo hằng niên, mọc ở đất hoang, rừng chồi, trảng cỏ, rừng thưa, rừng tái sinh... ít khi mọc ở rừng rậm... Thân, lá, trái đều có lông tơ. Hoa màu tím thẫm, chùm thòng. Trái hơi cong, khi già có màu nâu đen phủ đầy lông vàng, loại lông này rất ngứa. Khi các bạn vô tình chạm phải hay do gió thổi bay đến, thì ngứa ngáy khó chịu vô cùng, càng gãi càng ngứa. Nếu vào mắt thì có thể bị mù tạm thời.

Nếu bị dính lông mắt mèo, thì các bạn đừng gãi mà hãy áp dụng các biện pháp sau:

- Dùng rơm, cỏ khô, giấy . . . đốt thành lửa ngọn rồi hơi phốt mặt da cho lông mắt mèo bị cháy đi thì đỡ ngứa.
- Nắm cơm thành vắt (cơm nếp càng tốt) lăn trên chỗ ngứa cho lông mắt mèo dính theo.
- Dùng băng keo to bản dán áp vào nơi ngứa, ồi lấy ra, lông mắt mèo sẽ dính theo băng keo.



XƯƠNG KHÔ – CÀNH GIAO

Tên khoa học: *Euphorbia tiruc*

Thuộc Họ *Thầu dầu* (*Euphorbia*)

Cây có thể cao tới 4-5 mét, cành gãy, khẳng khiu, mang rấ Hiện nay tại Việt Nam được trồng hàng rào và làm cảnh. Mủ rất dễ dùng để duốc cá. Người ta cho để nhựa cây bắn vào mắt sẽ bị mù



CÂY TRÚC ĐÀO (*Nerium oleander*)

Thuộc Họ Trúc Đào (Apocinaceae)

Có hoa rất đẹp nên trồng làm cảnh rất phổ biến ở Việt Nam

Tất cả các bộ phận của cây đều độc, từ thân, vỏ, lá và hoa (hoa khô để 7 năm vẫn còn độc). Vỏ và lá trúc đào là các bộ phận độc nhất chứa 3 hoạt chất oleandrosid, nériosid, nérianthosid đều là các heterosid gây độc lên tim giống như loại dược thảo digitalis. Với người, chỉ cần ăn một lá trúc đào nhỏ cũng có thể chết. Kể cả uống nước suối gần nơi có rễ trúc đào cũng dễ bị ngộ độc.

Độc chất của trúc đào tác động trực tiếp lên cơ tim làm chậm nhịp tim, gia tăng biên độ co thắt, làm giảm tốc độ dẫn truyền của dây thần kinh. Liều gây tử vong là 2mg cho mỗi ký cân nặng. Chúng còn gây sự kích thích tại chỗ và làm tiêu hủy máu.

